

INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES

La Asociación Española de Pediatría (AEP) recomana per a la població infanto-juvenil algunes vacunes **NO FINANÇADES** pel Servei Català de la Salut en el moment actual.

Aquestes vacunes són les següents:

1. **Vacuna enfront del rotavirus. Rotarix® Rotateq®.** El rotavirus és la principal causa d'hospitalització per diarrea en els primers anys de vida i afecta, almenys una vegada, a tots els nens menors de 5 anys. La vacuna disponible ha demostrat la seva seguretat i eficàcia.
 - **Rotarix®:** S'administren 2 dosis entre les 6 i les 24 setmanes de vida, separades com a mínim 4 setmanes. La primera dosi ha d'administrar-se abans de la 16a setmana de vida.
 - **Rotateq®:** S'administren 3 dosis entre les 6 i les 32 setmanes de vida, separades com a mínim 4 setmanes. La primera dosi ha d'administrar-se abans de la 12a setmana de vida.
2. **Vacuna enfront del meningococ tipus B: Bexsero®.** El meningococ és un bacteri que pot causar meningitis o bé una infecció generalitzada a tot el cos, anomenada sèpsia. El tipus B és el més freqüent a tota Europa. La vacuna és immunògena i segura. S'administren 3 dosis, als 2, 4 i 6 mesos d'edat i una 4^a dosi de record entre els 12 i 15 mesos de vida. La vacunació es pot iniciar a qualsevol edat; si s'inicia a partir dels 6 mesos calen menys dosis. Bexsero® es pot administrar conjuntament amb la resta de vacunes del calendari, llevat de la vacuna enfront del meningococ tipus C, per manca d'estudis. Pot provocar febre amb més probabilitat que la resta de les vacunes en cas d'administració conjunta.

Si voleu més informació o administrar aquestes vacunes, parleu amb el vostre pediatre. També podeu consultar la informació del Comité Asesor de Vacunas de la AEP a la següent pàgina web: www.vacunasaep.org