



## INFORMACIÓ SOBRE VACUNES PER A LES FAMÍLIES (INFANTS)

Com a pediatres, informem que els Consells Assessors de les Societats Científiques de diferents països recomanen l'administració de vacunes no incloses dins del calendari vacunal del "Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud" i no finançades pel Servei Català de la Salut, en el moment actual.

### 1. Vacuna contra el Rotavirus. *Rotateq®*, *Rotarix®*

El Rotavirus és la principal causa d'hospitalització per diarrea en els primers anys de vida i afecta, si més no, una vegada a tots els nens i nenes menors de 5 anys. La complicació més freqüent és la deshidratació. La infecció per rotavirus ha estat relacionada també amb les convulsions febrils.

Les vacunes disponibles en front el rotavirus han demostrat la seva seguretat i eficàcia. *Rotateq®*, *Rotarix®* son d'administració oral i es recomana administrar la primera dosi abans de les 12-18 setmanes de vida, depenent de la marca utilitzada.

Consulteu la pauta de vacunació amb el vostre pediatre/a o infermer/a pediàtrica.

### 2. Vacuna contra el Meningococ tipus B: *Bexsero®*, *Trumenba®*

El meningococ és un bacteri que pot causar meningitis i/o una infecció generalitzada a tot el cos, anomenada sèpsia. Pot presentar una clínica fulminant, amb mortalitat elevada i seqüeles neurològiques. Afecta principalment a nens/es petits/es i a adolescents. La incidència en el nostre país és baixa.

Existeixen dues vacunes disponibles, *Bexsero®* (a partir dels 2 mesos) i *Trumenba®* (a partir dels 10 anys), que han demostrat seguretat i eficàcia.

Consulteu la pauta de vacunació amb el vostre pediatre/a o infermer/a pediàtrica.

### 3. Vacuna tetravalent contra dels Meningococs ACWY: *Menveo®*, *Nimenrix®*.

Aquests tipus de meningococs també poden causar meningitis i/o sèpsia. Alguns Comitès de vacunes de les Societats Científiques Pediàtriques recomanen la vacunació amb vacuna tetravalent als 12 mesos i 12 anys. El SNS ha aprovat l'administració, de forma finançada, de la dosi dels 12 anys

La vacuna *Menveo®* es pot posar a partir dels 24 mesos i *Nimenrix®* a partir de les 6 setmanes de vida

Consulteu la pauta de vacunació amb el vostre pediatre/a o infermer/a pediàtrica.

**Si voleu més informació o administrar aquestes vacunes, parleu amb el vostre pediatre/a. També podeu consultar la informació del *Comité Asesor de Vacunas* de la AEP a la següent pàgina web: [www.vacunasaep.org](http://www.vacunasaep.org)**



## INFORMACIÓ SOBRE VACUNES PER A LES FAMÍLIES (ADOLESCENTS)

Com a pediatres, informem que els Consells Assessors de les Societats Científiques de diferents països recomanen l'administració de vacunes no incloses dins del calendari vacunal del "Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud" i no finançades pel Servei Català de la Salut, en el moment actual.

### 1. Vacuna contra el Meningococ tipus B: *Bexsero*®, *Trumenba*®

El meningococ és un bacteri que pot causar meningitis i/o una infecció generalitzada a tot el cos, anomenada sèpsia. Pot presentar una clínica fulminant, amb mortalitat elevada i seqüeles neurològiques. Afecta principalment a nens petits i a adolescents. La incidència en el nostre país és baixa.

Existeixen dues vacunes disponibles, *Bexsero*® (a partir dels 2 mesos) i *Trumenba*® (a partir dels 10 anys), que han demostrat seguretat i eficàcia.

Consulteu la pauta de vacunació amb el vostre pediatre/a o infermer/a pediàtrica.

### 2. Vacuna tetravalent en contra dels Meningococs ACWY: *Menveo*®, *Nimenrix*®.

Aquests tipus de meningococs també poden causar meningitis i/o sèpsia. Alguns Comitès de vacunes de les Societats Científiques Pediàtriques recomanen la vacunació amb vacuna tetravalent als 12 mesos i 12 anys. El SNS ha aprovat l'administració, de forma finançada, de la dosi dels 12 anys

La vacuna *Menveo*® es pot posar a partir dels 24 mesos i *Nimenrix*® a partir de les 6 setmanes de vida

Consulteu la pauta de vacunació amb el vostre pediatre/a o infermer/a pediàtrica.

### 3. Vacuna en contra el virus del Papil·loma humà (VPH): *Gardasil*®, *Cervarix*® i *Gardasil 9*®

La infecció per aquest virus està relacionada amb berrugues genitals, càncer de l'àrea genital, anal i orofaríngic. La vacuna *Gardasil 9*® és la que actualment s'administra a Catalunya, de forma finançada, a totes les noies a partir dels 11 anys i persones amb risc de contagi. S'ha demostrat segura i eficaç.

La recomanació de la vacunació s'estén als nois per disminuir la transmissió del virus i protegir-los enfront les malalties causades pel VPH.

Consulteu la pauta de vacunació amb el vostre pediatre/a o infermer/a pediàtrica.

**Si voleu més informació o administrar aquestes vacunes, parleu amb el vostre pediatre/a. També podeu consultar la informació del *Comité Asesor de Vacunas* de la AEP a la següent pàgina web: [www.vacunasaep.org](http://www.vacunasaep.org)**